Réseau Sagnes
Le réseau qui se mouille !

Conservatoire d'espaces naturels Auvergne

Lettre d'information #13 - Hiver 2023

LES PRAIRIES HUMIDES DE FAUCHE

3 BONNES RAISONS D'ADHÉRER AU RÉSEAU SAGNES :

- JE BÉNÉFICIE DE CONSEILS TECHNIQUES POUR LA MISE EN PLACE D'ACTIONS CONCRÈTES ;
- JE PARTICIPE À DES JOURNÉES D'ÉCHANGES ET DE FORMATIONS ;
- JE M'IMPLIQUE POUR LA PRÉSERVATION D'UN BIEN COMMUN, LA RESSOURCE EN EAU !

Les prairies humides de fauche sont **aussi importantes pour l'éleveur que pour la biodiversité.**
En effet, elles constituent des **réservoirs** grâce à la présence de nombreuses plantes et d'espèces animales. Ces espaces de tranquillité permettent, par exemple, aux oiseaux de nicher au sol.

Pour l'agriculteur, malgré certaines contraintes d'exploitation, ces prairies présentent l'avantage de constituer **un fourrage stable au fil des années** (peu de variation de rendement) **à moindre coût** (peu de fertilisation, pas de travail du sol).
Elles bénéficient d'un très bon report sur pied ; le fourrage conserve ses qualités alimentaires dans le temps, autorisant un étalement de la fauche sur des périodes moins chargées pour l'agriculteur. Enfin, elles permettent un pâturage du regain même lors d'années très sèches.

Focus sur ces milieux dans ce numéro !

TÉMOIGNAGE

Jérémy Chancel,
agriculteur à Nouvialle (Valuéjols, Cantal).
Troupeau mixte : allaitant en race Salers et laitier en races Abondance et Montbéliarde.

Canche cespiteuse

Comment valorises-tu tes prairies humides de fauche ?

*" J'ai des prairies humides de fauche qui sont occupées presque entièrement par la Canche cespiteuse.
Je ne peux pas les faucher à la bonne période car les sols sont trop humides. Depuis quelques années, je les fauche donc plus tardivement en les enrubannant.
Même si elles sont fauchées après la mi-juillet, la fermentation de l'herbe provoquée par l'enrubannage permet d'attendrir les fibres de ces plantes « raides » et l'appétence est bien améliorée. Je donne ce foin surtout aux génisses et vaches allaitantes. "*

En 2023, tu as essayé de valoriser ces prairies humides de fauche pour de la litière. Comment as-tu procédé ?

" J'ai fauché une partie des zones humides très tard pour que l'herbe de zone humide sèche bien sur pied (fin août). Puis, en fânant deux fois pour bien sécher l'herbe, elle a été récoltée en balle ronde avec une presse à couteau (l'herbe est broyée avant d'être pressée). J'ai commencé à utiliser cette litière dans les bâtiments, en alternance avec la paille. Il faut maintenant la tester sur un hiver complet, mais les premiers résultats sont vraiment concluants.

Ces deux modes de récolte me permettent de valoriser des prairies qui ne sont accessibles que tard en saison à cause des sols humides. Ça m'évite de gâcher de l'herbe en les faisant pâturer tardivement. Avec ces méthodes, les zones humides deviennent plus intéressantes dans mon autonomie fourragère."

Prairie humide à Canche cespiteuse

ZOOM NATURALISTE

LA FRITILLAIRE PINTADE

- **Nom latin :** *Fritillaria meleagris*
- **Famille :** *Liliacées (comme les tulipes et les jacinthes)*
- **Taille :** de 20 à 50 cm
- **Signes caractéristiques :**
  Plante facilement reconnaissable lorsqu'elle est en fleur avec une inflorescence tournée vers le sol d'un rose foncé, ponctuée de carreaux pourpres et blanchâtres disposés en damier.
- **Où la voir ?**
  Cette espèce est présente en Auvergne, essentiellement sur l'Aubrac dans la vallée du Bès. Elle est parmi les premières espèces à fleurir au printemps dans les prairies inondables. La Fritillaire pintade est aujourd'hui en péril car son habitat disparait peu à peu.



D'OÙ VIENT SON NOM ?

Son nom vient du latin *fritillus*, qui désigne une sorte de cornet utilisé pour jeter les dés, en référence à la forme de sa fleur.
Mais quel est le rapport avec la pintade (*meleagris* en latin) ?
Ce sont les différentes couleurs réparties en damier sur la fleur, rappelant le plumage moucheté de cet oiseau africain !

LES BONNES PRATIQUES DE FAUCHE EN PRAIRIE HUMIDE

1

Adapter les périodes de fauche
Les zones humides ne doivent être fauchées qu'une fois les sols ressuyés et accessibles sans risque de tassement et d'orniérage.
Cela permet d'étaler la période de fauche entre les parcelles sèches et humides.

2

Faucher en bande ou de manière centrifuge pour permettre à la faune de s'échapper vers les bordures

3

Maintenir des zones non fauchées (angles de parcelle, pieds de haies, bordure des rases et cours d'eau)
Ces zones sont des refuges pour la faune et des zones de corridors.
Cela permet aussi à la végétation de s'exprimer, contribuant au renouvellement naturel des semences.

4

Maintenir des haies pour favoriser l'ombrage et la rétention de l'eau
Au bénéfice de la pousse de l'herbe et de la résistance aux sécheresses

Quelques autres bon réflexes !

- Ne pas fertiliser les zones humides (risque de fort lessivage notamment et impact sur la qualité de l'eau)
- Régler la hauteur de fauche autour de 10 cm
- Adapter la vitesse du tracteur (moins de 10 km/h)
- Si possible, utiliser une barre d'effarouchement

ACTUALITÉS

• Restauration de cours d'eau et de zones humides sur la commune de Saint-Saturnin (15)

Cet été, des travaux de restauration d'un affluent du Lemmet et des zones humides associées ont été réalisés sous maîtrise d'ouvrage de Hautes Terres Communauté et de l'assistance technique du CEN Auvergne.
Au programme : 400 mètres linéaires de reméandrage du ruisseau dans son lit naturel, reconnexion des zones humides associées, enlèvement de drains, mise en défens des berges et aménagements de trois points d'abreuvement / franchissement pour le bétail.

Ce projet permet ainsi de restaurer une bonne fonctionnalité des milieux aquatiques et humides, tout en conciliant les usages agricoles en place sur la parcelle.

Travaux de restauration Saint-Saturnin

• Une nouvelle zone humide préservée à Saint-Simon (15)

Début octobre, une nouvelle Obligation Réelle Environnementale (ORE) a été signée entre la commune de Saint-Simon et le CEN Auvergne pour une durée de 30 ans et renouvelable jusqu'à 99 ans, sur une surface de plus de 11 ha.
Cette zone humide située le long du Mamou est importante pour le territoire car elle permet de stocker l'eau naturellement dans le sol en période de fortes précipitations et de la restituer progressivement en période estivale.

La poursuite de l'usage agricole, la mise en place d'actions de connaissance, de gestion et de valorisation sont au programme dans les années à venir !

Signature d'une ORE à Boussac

Réseau Sagnes
Le réseau qui se mouille !

Dans le Cantal et le Puy-de-Dôme (sur le bassin Adour-Garonne) :
63 adhérents pour environ 508 ha de zones humides préservées.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité · eau GRAND SUD-OUEST AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE · La Région Auvergne-Rhône-Alpes · L'EUROPE S'ENGAGE en région Auvergne-Rhône-Alpes avec le FEDER · UNION EUROPÉENNE